

## Rifampicina (oral)

La RIFAMPICINA (rif-AM-pin, pronunciación en inglés) se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis (TB), por lo general, en combinación con otros medicamentos para la TB. La Rifampicina también puede utilizarse para el tratamiento de otros problemas médicos.

Informe a su médico, enfermera o farmacéutico si:

- sufre de alergias;
- está embarazada o planea quedar embarazada;
- está amamantando a un bebé;
- toma algún otro medicamento recetado, entre otros, píldoras anticonceptivas y diluyentes de la sangre; Las PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS que contienen estrógeno *pueden no* actuar mientras esté tomando Rifampicina. Hable con su proveedor de atención médica especializado en reproducción acerca de otros posibles métodos anticonceptivos para evitar el embarazo.
- toma cualquier medicamento de venta libre, tales como medicamentos para el resfrío y calmantes (Tylenol<sup>®</sup>, Advil<sup>®</sup>, Motrin<sup>®</sup>, aspirina);
- sufre algún otro problema médico,

como enfermedades hepáticas o consume alcohol.

### Tome este medicamento:

- exactamente como se lo indicó su médico y NO DEJE de hacerlo hasta que se lo indiquen, aun cuando se sienta mejor;
- con un vaso lleno de agua y con el estómago vacío (ya sea 1 hora antes o 2 horas después de las comidas). Si este medicamento le produce malestar estomacal, puede tomarlo con alimentos.
- de manera regular. Los efectos secundarios pueden resultar más molestos si no se toma el medicamento según el horario programado.

### Advertencia:

- Este medicamento provocará que la orina, heces, saliva, esputo, transpiración y lágrimas adquieran un color anaranjado o rojizo.
- Este medicamento puede también MANCHAR prendas y lentes de contacto blandos.
- La rifampicina puede reducir temporalmente el número de glóbulos blancos, lo que aumenta las posibilidades de de contraer una

infección. También puede reducir la cantidad de plaquetas necesarias para una adecuada coagulación de la sangre. **TENGA CUIDADO** cuando cepille sus dientes o use hilo dental ya que puede ser más susceptible a contraer infecciones y enfermedades en las encías. Consulte con su médico y dentista antes de someterse a un tratamiento dental.

- Restrinja el consumo de bebidas alcohólicas mientras esté tomando este medicamento para evitar posibles problemas hepáticos. Además, el alcohol puede disminuir la eficacia del medicamento.
- No se olvide de ninguna dosis. Si se olvida de una, tómela tan pronto como lo recuerde. Saltee la dosis olvidada si es casi el horario de la dosis siguiente programada. **NO** tome dos dosis al mismo tiempo.
- No comparta el medicamento con otros
- Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.
- Visite a su médico periódicamente.
- Guarde el medicamento en un lugar seco y fresco, alejado del frío o calor extremo.
- Si cree haber ingerido una sobredosis de este medicamento, consulte a su

médico.

- No conduzca ni intente realizar tareas peligrosas si este medicamento le provoca mareos.

**Los posibles efectos secundarios de este medicamento son, entre otros:**

- diarrea
- calambres estomacales

**Informe inmediatamente a su médico si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios POCO COMUNES :**

- fiebre o escalofríos
- mareos
- dolor de cabeza
- dificultad para respirar
- erupción cutánea, enrojecimiento o picazón
- dolor muscular u óseo
- orina turbia o con sangre
- reducción en la frecuencia o en la cantidad de orina
- náuseas, vómito o pérdida del apetito
- dolor de garganta
- magulladuras o sangrado inusuales
- cansancio o debilidad inusuales
- ojos o piel amarillentos

Reproducido, con autorización, de la United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1989-2003. Impreso en marzo de 2003 por el Department of Nursing de la University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority, Madison, WI. Revisado por el Department of Pharmacy. UWH #4788.